

発生予察情報誌(阪神管内 南部・北部)

高温・乾燥注意！！

発行：阪神地区営農振興協議会 農業技術分科会 2025年7月16日

例年より梅雨が早く明け、暑い時期が続いております。早い地区では、水稻の穂がちらほら見え始めました。

果菜類でオオタバコガ、ハダニ類が見られます。圃場をしっかりと観察し、必要な灌水はしっかり、たっぷりお願いします。

【ハダニ類に注意】

症状：初期症状で葉に白い斑点状の吸汁痕(かすり状)が現れ、被害が進行すると褐色し落葉します。その後、新しい葉に次々と移動していきます。

対策：○育苗をハダニ発生ほ場の周辺で行わないようにしましょう。

※サフオイル乳剤は野菜類で登録があります。

○周辺のハダニ密度を極力低下させましょう。(写真右：ナスの被害)

○農薬を散布するときは、葉の裏表にまんべんなく散布し、他の農薬とローテーションしましょう。



ナス ハダニ類 適用農薬情報

農薬名	IRAC	希釈倍率	使用時期	使用回数
サフオイル乳剤	-	300~500倍	収穫前日まで	-
コテツフロアブル(劇)	13	2000倍		4回以内
グレーシア乳剤	30			2回以内
モバントフロアブル	23			3回以内

【イチジクの疫病・さび病に注意】

雨が降る前の予防散布を心掛けてください。

定期的な薬剤散布で8、9月のゲリラ豪雨、長雨等にも使用出来るよう、

使用回数に注意してください。



マダラ模様の病斑
写真：疫病

品目	病害名	薬剤名	FRACコード	希釈倍率	使用時期	使用回数
イチジク	疫病	アミスター10フロアブル	11	1000倍	収穫前日まで	3回以内
		ランマンフロアブル	21	2000倍	収穫前日まで	3回以内
		ダコニール1000	M05	2000倍	収穫前日まで	2回以内
	さび病	アミスター10フロアブル	11	1000倍	収穫前日まで	3回以内
		アンビルフロアブル	3	1000倍	収穫前日まで	2回以内
		ダコニール1000	M05	2000倍	収穫前日まで	2回以内

水稻情報 イネカメムシに注意！！

畦畔の草刈りは終わっていますか？全国的にイネカメムシ(不稔米の原因)、

斑点米カメムシが多いと注意報(兵庫県病害虫防除所より)が出ています。阪神管内においても

イネカメムシの発生が確認されました。ウンカ類・カメムシ類は引き続き注意が必要ですので、

圃場をよく観察し、適期防除をお願いします。(写真右：イネカメムシ)

畦畔の草刈りは出穂2週間前までにすませましょう。



農薬名	IRAC	適用害虫	10a当たりの使用量	使用時期	使用回数
トレボン粉剤DL	3A	カメムシ類、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、ニカメイチュウ	3~4Kg	収穫7日前まで	合計3回以内
スタークル粒剤	4A	ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、カメムシ類	3Kg		合計3回以内 ※スタークル粒剤、スタークル豆つぶ剤は同じジノテフランを成分とするため
スタークル豆つぶ剤		ウンカ類、ツマグロヨコバイ	250~500g		
		カメムシ類	250g		

必ず農薬のラベルを確認し、使用基準を順守下さい。本件に関するお問い合わせは、お近くの営農支援センター又は阪神農業改良普及センターまで。

JA兵庫六甲のHPにも掲載。生産者の皆様へ<<その他<<阪神南部地区・阪神北部地区 野菜 水稻情報を参考下さい。