

# 北神野菜情報 3号

作成・発行:北神営農振興会

構成員:神戸農業改良普及センター、神戸市、JA兵庫六甲神戸北営農総合センター

巡回地区:八多・上淡河・淡河・山田・有野・道場・大沢・長尾



## 圃場巡回結果

巡回日:平成29年8月25日(金)

今回の巡回ではアブラムシ類やアザミウマ類等の害虫の発生を確認しました。

よく圃場を観察し、予防と早期の発見・防除に努めましょう。また、降雨後は、圃場の排水を行うなど、病害の発生しにくい条件を整えましょう。

☆今回の圃場巡回(20ヶ所)で、特に下記のような病害虫が確認されました。

品目	調査数	病害虫	程度	薬剤	希釈倍率 使用量	使用時期	本剤使用 回数
エダマメ	4	カメムシ類	少	トレボン乳剤	1000倍	収穫14日前まで	2回以内
なす	5	ハダニ類	少	アフーム乳剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内
		アザミウマ類	中				
キュウリ	4	アブラムシ類	大	モベントフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内
		アザミウマ類 コナジラミ類	中				
ねぎ	4	アザミウマ類	大	モスピラン顆粒水溶剤 (劇)	2000倍	収穫7日前まで	3回以内
オクラ	3	アブラムシ類	少	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	2回以内

※なすに発生しているハダニ類4は圃場によって発生度合いが大きく異なります。

※程度は軽微なものから、無<微<少<中<多<甚と表します。

※農薬使用時は必ずラベルの登録内容を確認し、その内容に従ってご使用ください。


【劇】の農薬は劇物を表しています。ご購入の際は、印鑑をご持参ください。

次回の調査予定日は、平成29年9月5日(火)です

\*お問合せ先\* JA兵庫六甲 神戸北営農総合センター

TEL:078-981-5540

FAX:078-981-5817



# 北神野菜情報 2号

作成・発行:北神営農振興会

構成員:神戸農業改良普及センター、神戸市、JA兵庫六甲神戸北営農総合センター

巡回地区:八多・上淡河・淡河・山田・有野・道場・大沢・長尾



## 圃場巡回結果

巡回日:平成29年7月18日(火)

今回の巡回ではアブラムシ類やアザミウマ類等の害虫の発生を確認しました。

よく圃場を観察し、予防と早期の発見・防除に努めましょう。また、降雨後は、圃場の排水を行うなど、病害の発生しにくい条件を整えましょう。

☆今回の圃場巡回(18ヶ所)で、特に下記のような病害虫が確認されました。

品目	調査数	病害虫	程度	薬剤	希釈倍率 使用量	使用時期	本剤使用 回数
トマト	3	コナジラミ類	少	スタークル顆粒水溶剤	2000~ 3000倍	収穫前日まで	2回以内
キュウリ	4	アブラムシ類	中				
		アザミウマ類	少	スタークル顆粒水溶剤	2000倍		
なす	8	アザミウマ類	少	モベントフロアブル	2000倍	収穫前日まで	3回以内
		アブラムシ類	少				
		ハダニ類	中 ~ 甚				
ねぎ	3	アザミウマ類	少	サイアノックス乳剤	500~ 1,000倍	収穫21日前まで	2回以内
		さび病	少	アフエットフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	2回以内

※なすに発生しているハダニ類4は圃場によって発生度合いが大きく異なります。

※程度は軽微なものから、無<微<少<中<多<甚と表します。

※農薬使用時は必ずラベルの登録内容を確認し、その内容に従ってご使用ください。


【劇】の農薬は劇物を表しています。ご購入の際は、印鑑をご持参ください。

次回の調査予定日は、平成29年8月25日(火)です

\*お問合せ先\* JA兵庫六甲 神戸北営農総合センター

TEL:078-981-5540

FAX:078-981-5817



# 北神野菜情報 第1号

作成・発行:北神営農振興会

構成員:神戸農業改良普及センター、神戸市、JA兵庫六甲神戸北営農総合センター

巡回地区:八多・上淡河・淡河・山田・有野・道場・大沢・長尾



## 圃場巡回結果

巡回日:平成29年6月20日(火)

今回の巡回でアザミウマ類・アブラムシ類の虫害と、ナスでハダニ類の発生等を確認しました。キュウリやカボチャにうどんこ病の発生も確認しており、今後は発生拡大が懸念されます。よく圃場を観察し、予防と早期発見・防除に努めましょう。雨天が続く場合には、圃場の排水を行いましょ。

☆今回の圃場巡回(23ヶ所)で、特に下記のような病害虫が確認されました。

品目	調査数	病害虫	程度	薬剤	希釈倍率 使用量	使用時期	本剤使用 回数
トマト	4	アブラムシ類	少	モスピラン顆粒水溶剤【劇】	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
		アザミウマ類	少				
キュウリ	4	アブラムシ類	中	モスピラン顆粒水溶剤【劇】	2000倍~ 4000倍	収穫前日まで	3回以内
		アザミウマ類	中				
		うどんこ病	少	アフェットフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
なす	5	アブラムシ類	少	スタークル顆粒水溶剤	3,000倍	収穫前日まで	2回以内
		アザミウマ類	中		2,000倍		
		ハダニ類	中	ニツラン水和剤	2000倍~ 3000倍	収穫前日まで	2回以内
ねぎ	5	アザミウマ類	中	スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫3日前まで	2回以内
		さび病	少	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫3日前まで	4回以内
すいか	1	アブラムシ類	少	モスピラン顆粒水溶剤【劇】	2000倍~ 4000倍	収穫3日前まで	3回以内
サツマイモ	1	ハダニ類	微	ニツラン水和剤	2,000倍	収穫7日前まで	2回以内
かぼちゃ	1	うどんこ病	微	アフェットフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
とうもろこし ※未成熟	2	アブラムシ類	少	モスピラン顆粒水溶剤【劇】	2,000~ 4,000倍	収穫前日まで	3回以内

※程度は軽微なものから、無 < 微 < 少 < 中 < 多 < 甚 と表します。

※農薬使用時は必ずラベルの登録内容を確認し、その内容に従ってご使用ください。

【劇】の農薬は劇物を表しています。ご購入の際は、印鑑をご持参ください。

次回の調査予定日は、平成29年7月18日(火)です。

\*お問合せ先\* JA兵庫六甲 神戸北営農総合センター

TEL:078-981-5540

FAX:078-981-5817

