

トビイロウンカ(秋ウンカ)注意報！！

令和4年9月13日

兵庫六甲農業協同組合
神戸農業改良普及センター

西区管内にてトビイロウンカ（秋ウンカ）による坪枯れが発生しています。

晩生品種（あきだわら、ヒノヒカリなど）では特にトビイロウンカによる坪枯れ発生が大きく懸念されますので、ほ場をよく観察し、発生している場合は早急に防除してください。

※特に出穂前防除を実施していない場合はご注意ください。

○対策

トビイロウンカは稲の株元に生息していますので、株元をよく観察してください（写真）。局所的に発生している場合が多いので、ほ場内数ヶ所で100株程度は観察しましょう。薬剤散布する場合は、株元まで薬剤が十分に届くよう散布してください。

薬剤名	107-ル当たり使用量	使用時期	使用回数
スタークル顆粒水溶剤	3000倍 60～150ℓ	収穫7日前まで※	3回以内※
トレボン乳剤	1000倍～2000倍 60～150ℓ	収穫14日前まで※	3回以内※

※使用の際は収穫期までの期間及び使用回数にご注意ください。



トビイロウンカが
発生している稲の株元



幼虫、成虫のトビイロウンカ

坪枯れ発生田
(同心円状に枯れる症状)

